



- 1) ஐக்கரகாரம் -அக் கரகாரம்.
- 2) தாவரப்பெயர் -: ANACYCLUS PYRETHRUM.
- 3) தாவரக்குடும்பம் -: COMPOSITAE.
- 4) வறோ பெயர்கள் -: அக்காரகரா, ஸ்பானிஷ்பெல்விடோரி,அக்கரம் முதலியன.
- 5) தாவர அமைப்பு -: அக்கரகாரம் என்னும் மலிகைச் செடி கருமண்கலந்த பொறமைண்ணில் நன்கு வளரும். இதன் அமிலத்தன்மை 5 - 6 சிறந்தது. வட ஆப்பிரிக்க வரவான இது ஐரோப்பாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மலிகையாகும். தமிழ்நாட்டில் 1000 முதல் 1500 அடி வரையுள்ள மலைப் பிரதேசங்களில் பயிரிடலாம். இந்திய மருத்துவத்தில் அதிக மதிப்பு உடையது. இலகைகள் 15 செ.மீ. நீளமானதாகவும் ஆரம்பத்தில் இளம்பச்சை நிறமாகவும், முதிர்சியாகின்ற தருணத்தில் லசோன ஊதா நிறத்திற்கும் மாறிவிடும். பூக்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் சிவப்புப் பூள்ளிகளுடன் காணப்படும். ஒவ்வொரு செடியிலும் சுமார் 7-10 பூக்கள் இருக்கும். வரேகளில் சல்லி வரேகள் அதிகம் காணப்படும். வரேகள் 5 - 10 செ.மீ. நீளமானதாக இருக்கும்.

ஐரே'மனி, எகிப்து, கனடா, நாட்களில் பயிர் செய்யப்படுகிறது. இந்தியாவில் காஷ்மீர், இமாசலம் பிரதேசம், உத்திரப் பிரதேசம் மாநிலங்களில் பயிர் செய்யப்படுகிறது. வரே'களில் அனாசகை'ளின் பல்லிட'டோரின், என்ிட'ரனை ஆல்கஹால், ஹடைரோகரோலின், இன்யுலின், ஆவியாகும் தன்மை உள்ள எண்ணெய், சசொமையின் I, II, III, IV, அமடைகள் ஆகியவை குறைந்த அளவில் வரே'ல் உள்ளன. இதில் இருந்து பல்லிட'டோரின் அல்லது பரைத் திரின் எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது. இது நட் ஆறு மாதத்தில் அறுவடை செய்யலாம். ஒரு மாத வயதுடைய நாற்றை நடவண்டும். இலகைகள் பழுப்பு நிறமாக மாறி, பூக்கள் காய்ந்து விடும் தருணத்தில் அறுவடை செய்ய வண்டும். செடிகளை வரே'ரோடு பிடிங்கி எடுக்க வண்டும். வரே'களை நல்ல



