



2 / 7

Written by தமிழ்நாடு

Thursday, 03 March 2011 10:14 - Last Updated Thursday, 03 March 2011 10:24

இலங்கை நாட்டின் கடல் மீன்பிடியில், 80-90 வீதமானவை கரையோர மீன்பிடுகளாவே இருக்கிறது. கடற்கரையில் இருந்த 8-தொடக்கம் 10 கிலோமீற்றர் வரையான கண்டமடேட்டுப் பகுதி மீன்பிடியாகவும் இது அமைகிறது. இம் மீன்பிடியானது கண்டமடேட்டில் உள்ள மிகச் சிறிய பகுதியாகவுமே இருக்கிறது. மறைச்சொன்னபடி வடமாகாண கண்டமடேட்டுப் பரப்பளவு 1, 502,240 எட்டராகவும் இருக்கிறது. இதில் 8 கிலோமீற்றருக்கு உட்பட்ட, இன்று பயன்படும் மீன்பிடிப் பிரதேசம்: 478, 920 எட்டர் மட்டும். அதாவது சுமார் 32 சதவீதம் மட்டும் மீன்பிடிப் பிரதேசமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இலங்கையின் இவ்வாறான மொத்த கண்டமடேட்டு மீன்பிடிப் பயன்பாடு, நாட்டில் உள்ள மொத்த அளவில் அரைப்பங்குக்கும் குறைவாகவே இருக்கிறது. இலங்கையிலுள்ள 2 620 000 எட்டர் மொத்தக் கண்டமடேடுப் பரப்பளவில் 8 கிலோமீற்றருக்கு உட்பட்ட இன்றைய மீன்பிடிப் பயன்பாட்டுப் பிரதேசம், 1 023 500 எட்டராகவுமே இருக்கிறது.

இவ்வகை நுழைந்த வீதமாக சரிவரப் பயன்படுத்தப்பட்டாலே, இலங்கையின் கரையோர மீன்பிடியே நாட்டுக்குத் தனநிறைவைத் தானாகவே கொடுக்கக் கூடியதாக அமையக் கூடியதும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த 8 கிலோமீற்றருக்கு உட்பட்ட மீன்பிடியில் தங்கச்சிவலை (நலையோன் வலை), சூரூக்கு வலை, மடிவலை என்பன இலங்கை அரசால் நீண்டகாலமாகவே தடைசெய்யப்பட்டும் விட்டது. இந்திய (தமிழக) மீனவர்களின் இழுவைப்படகுகள் (ரோலர்கள்) இக் கண்டமடேடுகளைக் குள் உள்நுழைவதால், இந்த 200 மீற்றர் ஆழ நீர்த்தடாகத்தில் ஒருவிதமான பரேரிசைசல் ஒலியை இது எழுப்புகிறது. இதனால் மீனினங்கள் கரையில் இருந்து கலந்து விடுவதுடன், பாதுகாப்புக் காக தரையோடு படுத்தும் இவர்களின் மடிவலை இழுவைகளைக் வகையாகவும் மாட்டப்பட்டும் விடுகிறது. இவ் அசாதாரண நிலைமை, மீன்களின் இனவிருத்தியைக் கொடுமையாகப் பாதிப்பதோடு கரையோர மீன்பிடித் தொழிலையும் வகுவாக நாசப்படுத்துகிறது..

தங்கச்சிவலையின் கண்கள் 'பிளட்டை'ப் போலக் கார்மகை கொண்டவை. இதில் அகப்படும் மீன்களைப் பிரித்தெடுப்பதில் மீனின் உடலைப் பாதுகாப்பதற்கான இயற்கையாக அமைந்துள்ள மீனின் இழையை அதிக பாதிப்புக்கும் உள்ளாகுகிறது. சதேத்துக்கு உள்ளாகும் இம் மீன்களின் மறைப்பாடு, நீரூக்கு வளையே பகற்றியாகக் களால் வகுவாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகியும் விடுகிறது. இதனால் அவை உடன் மீன்பாவனைச் சந்தையில் விலைபோகாத தரம் குறைந்த மீன்களாக எளிதில் மாறியும் விடுகிறது. தங்கச்சிவலை ஆறழை மாத தொடர்பாவனையின் பின்னர் பாவிக் முடியாதும் போய் விடுகின்றன. இதன் பின்னர் இவ்வகை கடலிலே அல்லது கரையோரச் சூறநாடிலே போடப்பட்டும் (கைவிடப்பட்டும்) விடுகிறது. இதனால் கடலிலுள்ள உயிரினங்களும், கடலோரப் பறவையினங்களும் ஊர்வனங்களும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகுகின்றன. இவ்வகைகள் எளிதில் உக்கிரப் போக முடியாதவை என்பதால் இதன்







